

DISTRETTO SANITARIO

UNITÀ DI VALUTAZIONE TERRITORIALE

SCHEDA DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

PAZIENTE

Cognome e Nome	<input type="text"/>	
Sesso	<input type="text"/>	
Luogo di nascita	<input type="text"/>	
Data di nascita	<input type="text"/>	
Residente a	<input type="text"/>	Cap. <input type="text"/>
Via	<input type="text"/>	
Telefono	<input type="text"/>	
Codice Fiscale:	<input type="text"/>	

Paziente: _____ Data: _____

1a. DIMENSIONE CLINICA

Indice di Comorbilità (CIRS)¹

Patologie Cardiache (solo cuore)

Diagnosi

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Ipertensione (si valuta la severità, gli organi coinvolti vanno considerati separatamente)

Diagnosi

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Apparato vascolare (sangue, vasi, midollo, milza, sistema linfatico)

Diagnosi

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Apparato respiratorio (polmoni, bronchi, trachea sotto la laringe)

Diagnosi

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Occhi / O.R.L. (occhio, orecchio, naso, gola, laringe)

Diagnosi

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

¹ Palmalee P.A., Thuras P.D., Katz I.R., Lawton M.P.: Validation of the Cumulative Illness Rating Scale in a geriatric residential population. J. Am Geriatr. Soc. 1995; 43:130-137. Modificata per la raccolta delle diagnosi collegate alla codifica ICD-9 CM e la loro stadiazione per apparato ai fini della compilazione della CIRS da Studio VEGA di Fabio Vidotto & C. S.a.s. © 2003 SIAE 002540-D003388.

Apparato digerente tratto superiore (esofago, stomaco, vie biliari-epato-pancreatiche; escluso diabete)

Diagnosi

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Apparato digerente tratto inferiore (intestino, ernie)

Diagnosi

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Fegato

Diagnosi

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Rene

Diagnosi

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Apparato riproduttivo e altre patologie Genito-Urinarie (mammella, ureteri, vescica, uretra, prostata, genitali)

Diagnosi

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Apparato Muscolo-Scheletro e Cuta (muscoli, scheletro, tegumenti)

Diagnosi

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Patologie sistema nervoso (sistema nervoso centrale e periferico; non include la demenza)

Diagnosi

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Patologie sistema Endocrino-Metabolico (include diabete, infezioni, sepsi, stati tossici)

Diagnosi

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Stato mentale e comportamentale (include demenza, depressione, ansia, agitazione, psicosi)

Diagnosi

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Patologia principalmente invalidante

Quando è sorta?

- 1 Meno di 1 mese 2 Da 1 a 2 mesi 3 Da 2 a 3 mesi 4 Da 3 a 6 mesi 5 Più di 6 mesi

Indici di severità e di Comorbilità

Indice di severità a 13 item (CIRS)

media dei punteggi delle prime 13 categorie, escludendo la categoria "stato mentale e comportamentale"

Indice di severità a 14 item (CIRS)

media dei punteggi di tutte le categorie

Indice di comorbilità a 13 item (CIRS)

numero delle categorie nelle quali si ottiene un punteggio superiore o uguale a 3, escludendo la categoria "stato mentale e comportamentale"

Indice di comorbilità a 14 item (CIRS)

numero delle categorie nelle quali si ottiene un punteggio superiore o uguale a 3, calcolato su tutte le categorie

Legenda:

- 1- Nessuna menomazione**
- 2- Menomazione lieve:** non interferisce con le normali attività; trattamento facoltativo; prognosi eccellente (ad es. lesioni dermatologiche, ernie, emorroidi)
- 3- Menomazione Moderata:** interferisce con le normali attività; trattamento necessario; prognosi buona (ad es. colelitiasi, diabete o fratture trattabili)
- 4- Menomazione Grave:** è invalidante; trattamento necessario con urgenza; prognosi riservata (ad es. carcinoma operabile, ifisema polm., insuff. cardiaca conges.)
- 5- Menomazione Molto Grave:** può essere letale; trattamento di emergenza o inefficace; prognosi grave (ad es. infarto miocardio, ictus, emorragie digestive, embolia)

Il Medico compilatore: _____

Paziente: _____ Data: _____

2. DIMENSIONE FUNZIONALE

Indice di Barthel²

Item	Punteggio	
Alimentazione	10	Indipendente, capace di allocarsi qualsiasi ausilio tecnico necessario: si alimenta in un tempo ragionevole
	5	Necessita di aiuto, per esempio per tagliare
	0	Dipendente
Bagno/doccia	5	Senza assistenza
	0	Dipendente
Igiene personale	5	Capace di lavarsi mani e faccia, pettinarsi, lavarsi i denti e radersi. Un uomo deve essere capace di usare, senza aiuto, qualsiasi tipo di rasoio, comprese le manipolazioni necessarie. Una donna deve essere in grado di truccarsi, se abituata a farlo, ma non è necessario che sia in grado di acconciarsi i capelli
	0	Dipendente
Abbigliamento (vestirsi e svestirsi)	10	Indipendente, si allaccia le scarpe, si allaccia le chiusure, si applica i tutori
	5	Necessita di aiuto, ma esegue almeno la metà dei compiti entro un tempo ragionevole
	0	Dipendente
Controllo sfinterico intestinale	10	Controllo intestinale completo e nessuna perdita, capace di mettersi le supposte o praticarsi un enteroclisma se necessario
	5	Può necessitare di supervisione per l'uso di supposte o enteroclisma, occasionali perdite
	0	Incontinente
Controllo sfinterico vescicale	10	Controllo completo durante il giorno e la notte e/o indipendente con i dispositivi esterni o interni
	5	In genere asciutto durante il giorno ma non di notte, necessario l'aiuto parziale nell'uso dei dispositivi
	0	Incontinente o catetere a dimora (sottolineare la voce che interessa). Dipendente per l'applicazione di dispositivi interni o esterni
Uso del gabinetto	10	Capace di trasferirsi sul e dal gabinetto, gestire i vestiti senza sporcarsi, usare la carta igienica senza aiuto. Se necessario, può usare la comoda o padella, o il pappagallo, ma deve essere in grado di svuotarli e pulirli
	5	Necessita di supervisione per sicurezza con l'uso del normale gabinetto. Usa la comoda indipendentemente tranne che per svuotarla e pulirla
	0	Completamente dipendente
Trasferimento letto - sedia (incluso mettersi a sedere sul letto)	15	Indipendente, compreso, se necessario, il mettere i freni alla carrozzina e il sollevare le pedane
	10	Minima assistenza o supervisione
	5	Capace di sedersi, ma necessita di massima assistenza al trasferimento
	0	Dipendente
Deambulazione (compresa la capacità di spingere la carrozzina)	15	Indipendente per 45 metri può usare ausili
	10	Con aiuto o girello per 45 metri
	5	Indipendente con carrozzina per 45 metri (solo se incapace di camminare)
	0	Dipendente
Salire e scendere le scale	10	Indipendente, può usare ausili
	5	Necessita di aiuto o supervisione
	0	Non è in grado
BI	RAS	
	← →	Punteggio Totale

Il compilatore _____

² Mahoney Fl, Barthel D. "Functional evaluation: the Barthel Index." Maryland State Med Journal 1965;14:56-61.